



Под термином ИППП понимают инфекционные заболевания, наиболее частым путём заражения которыми является половой контакт. В настоящее время количество возбудителей, вызывающих ИППП более 30.

Это бактерии, вирусы, паразиты. Из них — 8 встречаются наиболее часто. Из этих 8 — 4 инфекции — сифилис, гонорея, хламидиоз и трихомониаз — сегодня поддаются лечению, а 4 — гепатит В, вирус простого герпеса, ВИЧ и вирус папилломы человека (ВПЧ) — являются неизлечимыми. Часто происходит заражение сразу несколькими возбудителями. Ряд ИППП повышают риск заражения ВИЧ-инфекцией в 3 и более раза.

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП)

- могут вызвать бесплодие, серьезное повреждение внутренних органов
- могут быть переданы партнеру и ребенку при беременности и в родах

Первые симптомы после незащищенного полового акта проявляются не так скоро и поражают организм

ВИЧ/СПИД Спустя месяцы или даже многие годы. Неизлечим	ГОНОРЕЯ 2-21 день или бессимптомно - Поражает кожу, сердце, суставы, вызывает слепоту.	ВПЧ/ГЕНИТАЛЬНЫЕ БОРОДАВКИ Недели и месяцы или бессимптомно. Причина рака шейки матки.
СИФИЛИС 1-12 недель - Поражает сердце, мозг, вызывает слепоту и невынашивание беременности.	ТРИХОМОНИАЗ 5-28 дней или бессимптомно. Преждевременные роды.	ВИРУС ГЕРПЕСА 1-30 дней или бессимптомно. Неизлечим, но может контролироваться медикаментозно.
ГЕПАТИТЫ В и С 1-9 месяцев Причина рака печени	ХЛАМИДИОЗ 2-7 дней или бессимптомно. Поражает суставы, одна из главных причин женского бесплодия.	ГАРДНЕРЕЛЛЕЗ. МИКОПЛАЗМОЗ. УРЕПЛАЗМОЗ Часто бессимптомно. Относятся к условно-патогенным возбудителям.

Обратитесь к своему лечащему врачу чтобы узнать методы диагностики и лечения

Имеется рекомендация, согласно которой рекомендуется, чтобы...

Неделя профилактики инфекций, передающихся половым путем



Что такое ИППП?

Существуют около тридцати заболеваний, которые объединили в одну группу, потому что все они передаются человеку при сексуальных контактах.

Их сокращенно называют ИППП – инфекции, передаваемые половым путем.

Причинами ИППП могут быть различные возбудители: вирусы, бактерии, дрожжевые грибы, простейшие и даже членистоногие насекомые.


Каждый человек имеет возможность защитить себя от ИППП и ВИЧ-инфекции, обладая знаниями, умением, навыками и применяя их в необходимых случаях. Самый надежный способ предупреждения ИППП – супружеская верность, основой которой являются взаимная любовь, уважение. Раннее начало половой жизни, частая смена половых партнеров, случайные половые контакты с несколькими половыми партнерами без использования средств индивидуальной профилактики являются факторами повышенного риска заражения ИППП.




ИНФЕКЦИИ ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ



ВИЧ



гонорея




вирус папилломы человека (ВПЧ)



сифилис



кандидоз



генитальный герпес

Причины роста случаев ИППП

Биологические

- патоморфоз заболеваний
- увеличение резистентных штаммов возбудителей

Медицинские

- бесконтрольная продажа антибиотиков и самолечение
- значительный прогресс в лабораторной диагностике ИППП