

КАК ОТЛИЧИТЬ КЛЕЩА

ФОРМА
Голодный клещ плоский и имеет очертания, похожие на треугольник.

ТЕЛО
Тело сплюснутое, нет разделений.

РАЗМЕРЫ
От 2,5 до 4 мм.
Когда насытится кровью, длина увеличивается до 11 мм.

ОКРАС
На спине находится тавотный щиток, причем у самца он коричневого цвета и прикрывает всю спину, а у самки щитком прикрыта лишь треть спинки. Остальная часть спины красно-бурого цвета.



ПЕРИОД АКТИВНОСТИ КЛЕЩЕЙ

Период наибольшей активности клещей приходится с апреля по июль включительно. Клещи встречаются в лесу, поле, на лугах, в городских парковых зонах, отдыха, и даже в транспорте – со своего или чужого букета полевых цветов, эленистов или других растений. Самое излюбленное место клещей – тропы и дорожки с концентрацией клещей – заросли травой обочины, так как клещи привлекают запах людей и животных. Максимальная активность клещей при средней дневной температуре +10 – 15°C. Клещи остаются активными в течение суток с 8 до 11 час, снижаются в дневное время и снова возрастают в период с 17 до 20 час.

ЧЕМ ОПАСЕН КЛЕЩ

КЛЕЩИ являются переносчиками опасных для человека заболеваний: крымской геморрагической лихорадки, клещевого энцефалита, боррелиоза (болезнь Лайма) и эрлихиоза. Заболевания передаются через укус клеща.

Крымская геморрагическая лихорадка
- это вирусное инфекционное заболевание с выраженной интоксикацией, кровоизлияниями на коже, слизистых оболочках, кровотечениями.

СИМПТОМЫ:
- недомогание;
- резкий подъем температуры (38-40 °C);
- боли в пояснице, суставах;
- геморрагические высыпания на теле;
- кровотечения из носа, десен, маточные.

Клещевой энцефалит (КЭ)
- это вирусное заболевание, характеризующееся преимущественным поражением центральной нервной системы, тяжелые осложнения этой инфекции могут привести к параличу и летальному исходу.

СИМПТОМЫ:
- недомогание;
- резкий подъем температуры (38-40 °C);
- сильная головная боль, боли в теле;
- тошнота, рвота.

Боррелиоз (болезнь Лайма)
- системное заболевание, поражающее суставы, сердце, нервную систему, мышечные ткани.

СИМПТОМЫ:
- кольцевидное пятно на месте укуса;
- сильные покраснения на других участках кожи;
- лихорадка.

Эрлихиоз
- инфекция, поражающая клетки крови и вызывающая острые лихорадочные заболевания, подобные гриппу.

СИМПТОМЫ:
- повышение температуры, озноб;
- боль в мышцах;
- кашель, воспаление горла;
- иногда возникает рвота и диарея.



ОСТОРОЖНО! КЛЕЩИ!

На человеке клещ цепляется за детали одежды и медленно перемещается вверх до доступных участков кожи. Чаще всего присасывание клещей происходит к тем участкам тела, которые имеют тонкую кожу, хорошее кровоснабжение – кожные покровы и хорошее кровоснабжение – подмышечные и подколенные впадины, шея, волосистая часть головы.

При укусе клещ выделяет в тело человека специальную слюну, которая вызывает у человека зуд и жжение, поэтому человек не чувствует этот укус.





ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПРИСОСАВШИХСЯ К ТЕЛУ КЛЕЩЕЙ НЕОБХОДИМО НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЬСЯ В МЕДИЦИНСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ!

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае"
тел. (8652) 29-83-70; 25-54-74

КАК СНЯТЬ КЛЕЩА?

1. Взять нить, накинуть петлю под основание хоботка, медленно раскачивать и одновременно потягивать вверх.
2. Пинцетом захватить клеща как можно ближе к хоботку, держа строго перпендикулярно поверхности укуса, повернуть клеща вокруг оси.
3. Когда клещ удален, ранку обработать йодом и обратиться в пункт серопрофилактики.



КОГДА КЛЕЩ УДАЛЕН, РАНКУ ОБРАБОТАТЬ ЙОДОМ И ОБРАТИТЬСЯ В ПУНКТ СЕРОПРОФИЛАКТИКИ

ЕСЛИ НА КОЖЕ ОСТАЛАСЬ ЧЕРНАЯ ТОЧКА – ЗНАЧИТ ВО ВРЕМЯ УДАЛЕНИЯ КЛЕЩА ОТОРВАЛСЯ ЕГО ГОЛОВКА ИЛИ ХОБОТОК. ТОЧКУ НУЖНО ОБРАБОТАТЬ ЙОДОМ – ГОЛОВКА ИЛИ ХОБОТОК ДОЛЖНЫ ВЫПАСТЬ

НЕЛЬЗЯ:

БРАТЬ КЛЕЩА ГОЛЫМИ РУКАМИ

ДЕЛАТЬ РЕЗКИЕ ДВИЖЕНИЯ, КЛЕЩ РАЗОРВЕТСЯ

ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАСЛО