



Под термином ИППП понимают инфекционные заболевания, наиболее частым путём заражения которыми является половой контакт. В настоящее время количество возбудителей, вызывающих ИППП более 30.

Это бактерии, вирусы, паразиты. Из них — 8 встречаются наиболее часто. Из этих 8 — 4 инфекции — сифилис, гонорея, хламидиоз и трихомониаз — сегодня поддаются лечению, а 4 — гепатит В, вирус простого герпеса, ВИЧ и вирус папилломы человека (ВПЧ) — являются неизлечимыми. Часто происходит заражение сразу несколькими возбудителями. Ряд ИППП повышают риск заражения ВИЧ-инфекцией в 3 и более раза.

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП)

- могут вызвать бесплодие, серьезное повреждение внутренних органов
- могут быть переданы партнеру и ребенку при беременности и в родах

Первые симптомы после незащищенного полового акта проявляются не так скоро и поражают организм

ВИЧ/СПИД Спустя месяцы или даже многие годы. Неизлечим	ГОНОРЕЯ 2-21 день или бессимптомно - Поражает кожу, сердце, суставы, вызывает слепоту.	ВПЧ/ГЕНИТАЛЬНЫЕ БОРОДАВКИ Недели и месяцы или бессимптомно. Причина рака шейки матки.
СИФИЛИС 1-12 недель - Поражает сердце, мозг, вызывает слепоту и невынашивание беременности.	ТРИХОМОНИАЗ 5-28 дней или бессимптомно. Преждевременные роды.	ВИРУС ГЕРПЕСА 1-30 дней или бессимптомно. Неизлечим, но может контролироваться медикаментозно.
ГЕПАТИТЫ В и С 1-9 месяцев Причина рака печени	ХЛАМИДИОЗ 2-7 дней или бессимптомно. Поражает суставы, одна из главных причин женского бесплодия.	ГАРДНЕРЕЛЛЕЗ. МИКОПЛАЗМОЗ. УРЕПЛАЗМОЗ Часто бессимптомно. Относятся к условно-патогенным возбудителям.

Обратитесь к своему лечащему врачу чтобы узнать методы диагностики и лечения

ИРЕКСА ПРОТРОМБОЛИТИЧЕСКАЯ, НЕОСКОРБИЛОВАЯ
КОМПЛЕКСНАЯ СЕЛЕКТИВНОСТЬ, 100


Что такое ИППП?

Существуют около тридцати заболеваний, которые объединяют в одну группу, потому что все они передаются человеку при сексуальных контактах. Их сокращенно называют ИППП – инфекции, передаваемые половым путем.

Причины ИППП могут быть различные возбудители: вирусы, бактерии, дрожжевые грибы, простейшие и даже членистоногие насекомые.



ИНФЕКЦИИ ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ



ВИЧ

гонорея


вирус папилломы человека (HPV)

сифилис

хламидия

генитальный герпес

Каждый человек имеет возможность защитить себя от ИППП и ВИЧ-инфекции, обладая знаниями, умением, навыками и применяя их в необходимых случаях. Самый надежный способ предупреждения ИППП — супружеская верность, основой которой являются взаимная любовь, уважение. Раннее начало половой жизни, частая смена половых партнеров, случайные половые контакты с несколькими половыми партнерами без использования средств индивидуальной профилактики являются факторами повышенного риска заражения ИППП.




Причины роста случаев ИППП

Биологические

- патоморфоз заболеваний
- увеличение резистентных штаммов возбудителей

Медицинские

- бесконтрольная продажа антибиотиков и самолечение
- значительный прогресс в лабораторной диагностике ИППП